

*Aus der Universitäts-Kinderklinik Gießen
(Vorstand: Professor Dr. Duken)*

Zur diagnostischen Bewertung des „Basalen Dreiecks“

Differtation
zur Erlangung der Doktorwürde
der medizinischen Fakultät der
Hessischen Ludwigs-Universität
zu Gießen

vorgelegt von
Helmut Zulauf
aus Darmstadt

Darmstadt 1934
Druck: G. L. Künzel, Darmstadt

Aus der Universitäts-Kinderklinik Gießen
(Vorstand: Professor Dr. Duken)

Zur diagnostischen Bewertung des „Basalen Dreiecks“

Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der medizinischen Fakultät der
Hessischen Ludwigs-Universität
zu Gießen

vorgelegt von
Helmut Zulauf
aus Darmstadt

Darmstadt 1934
Druck: G. L. Künzel, Darmstadt

Gedruckt mit Genehmigung der med. Fakultät zu Gießen

Referent: Privatdozent Dr. med. Paul Frik

Meinen lieben Eltern gewidmet



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In früheren Jahren bis zum Erscheinen von Pospischills Arbeit über „Die Klinik und Epidemiologie der Pertussis“ im Jahre 1921 vertreten die meisten Autoren die Meinung, daß man im Stadium katarrhale und convulsivum der Pertussis bei der Auskultation der Lungen fast immer grobe Geräusche findet, die aber aus den oberen Luftwegen stammen. Wird nun im Verlaufe der Pertussis tatsächlich die Lunge in Mitleidenschaft gezogen, so handelt es sich nach der damaligen Meinung immer um Komplikationen.

Ein Umschwung dieser allgemeinen Meinung trat im Jahre 1921 durch die schon oben erwähnte Arbeit Pospischills ein, der durch eingehende Untersuchungen zum erstenmal in den Vordergrund stellt, daß primär die Lunge mitergriffen ist, ja, daß der Lungenbefund spezifische Bedeutung hat.

Er sagt u. a.: „Die Pertussis läuft nur selten ab, ohne daß seitens der Lungen ein krankhafter, physikalischer Befund sich findet. In diesem scheint die Verankerung der Krankheit zu erfolgen. Häufig läßt sich eine Bronchitis nachweisen. Unter allen Lungenbefunden, am häufigsten schon am Anfang der Erkrankung, ist ein eigenartiges, klingendes, basales Rasseln zu hören. Die charakteristische Konsonanz der Pertussisraffelgeräusche hat ihre Ursache in einer Peribronchitis“.

Nebenbei sei bemerkt, daß sich die von Pospischill festgestellten Auskultationsbefunde nur in manchen Fällen zeigen, während in den meisten Fällen von unkomplizierter Pertussis ein vollkommen negativer Auskultationsbefund vorliegt. Evtl. könnte, nach Duken, dem manchmal auftretenden Knisterrasseln, das nach seiner Meinung vielleicht in den Bronchialendigungen entsteht, Bedeutung beigelegt werden.

Obige Feststellungen Pospischills werden durch die im Jahre 1927 von Feyrter erschienene pathologisch-anatomische Arbeit gestützt, der bei über 200 fezierten Pertussisfällen folgendes feststellte: „Die Lunge erkrankt frühzeitig im Ablauf des Keuchhustens. Frühzeitig und nachhaltig verankert sich die Entzündung am Bronchialbaum (schleimig eitrig-eitrige Endobronchitis und Endobronchiolitis, meist hochgradige Peribronchitis und Peribronchiolitis). Die Keuchhustenperibronchitis erklärt die lange Dauer der Erkrankung, ihr häufiges

Aufflackern, den eigenartigen Klang der Bronchialraffelgeräusche. Aus der Peribronchitis und Bronchiolitis entsteht in der Pertussislunge interstitiell die Pneumonie. Diese interstitielle Entzündung geht mit einer in Menge wechselnder Exsudation in die Alveolen einher. Die Keuchhustenlungenschädigungen sind selten wie aus einem Guß. Meist liegt ein Gemisch frischer und älterer Veränderungen vor.“

Erst Göttche wird 1928 durch die von Pospischill Feyrter etc. festgestellten Lungenveränderungen auf das Röntgenbild der Pertussislunge hingewiesen, und konnte im Rahmen einer Epidemie folgende röntgenologische Feststellungen machen. Die charakteristischen Veränderungen im Lungengewebe lassen sich einwandfrei im Röntgenbild nachweisen. Zunächst kommt es zu einer symmetrischen Vergrößerung beider Hilfen, die auch schon von anderen Autoren beschrieben waren (Köhler, Grödel, Aßmann, Duken etc.). Bald strahlen aus den Hiluschatten starke Stränge aus, besonders nach unten, nach oben und nach der Seite. Diese Stränge werden immer ausgeprägter, besonders die neben dem Herzrand nach dem Zwerchfell verlaufenden. Bei manchen Fällen besteht überhaupt keine Neigung zum Fortschreiten der Strangzeichnung, ein andermal besteht die Tendenz dieser Stränge weiter fortzuschreiten bis zum Zwerchfell zu reichen, um dann hinter dessen Konturen zu verschwinden. Der Schatten verbreitert sich über dem Zwerchfell, wird immer ausgeprägter, und da er sich oft symmetrisch entwickelt, fließt der Herzschatten mit ihm zusammen. In ausgeprägten Fällen haben wir diese Verschattung in Form eines „basalen Dreiecks“, dessen Basis durch das Zwerchfell und dessen Spitze durch die Wirbelsäule, etwas über dem Hili, gebildet wird. Es soll keine geometrische Figur sein, nur eine didaktische Bezeichnung darstellen. Je jünger das Kind ist, um so schmaler und länger ist das „basale Dreieck“, deshalb bei Säuglingen „langes Dreieck“ genannt. Hier reicht die Spitze fast bis zur Lungenspitze. Das basale Dreieck stellt den Typ der „Keuchhustenslunge“ dar und soll fast ausnahmslos bei allen schweren Pertussisfällen vorhanden sein, zu 40% bei den leichten. Diese röntgenologisch feststellbaren Veränderungen laufen den drei klinischen Stadien parallel. Es finden sich keine Veränderungen im Stadium catarrhale, dagegen für Pertussis charakteristische, das „basale Dreieck“ im Stadium convulsivum. Je schwerer dieses Stadium, um so ausgeprägter ist das basale Dreieck. Im Stadium decrementi langsame Lösung, deren Reste evtl. noch Monate nachher röntgenologisch feststellbar sind.

Diese von Göttche festgestellten Veränderungen werden in einer im Jahre 1933 erschienen Arbeit von Hünemann im wesentlichen bestätigt.

Auch die im Jahre 1930 von Duken herausgegebene Arbeit „die eitrige Keuchhustenbronchitis und ihre Behandlung“ erscheint hier erwähnenswert. Ganz abgesehen von der Tatsache, daß Duken aus dem zu weit reichenden Symptomenkomplex der Keuchhustenlunge Pospischills als Komplikation die eitrige Bronchitis isoliert und auf ihre Diagnostik und Therapie eingeht, stellt er fest: „Jedenfalls wird es im großen und ganzen erlaubt sein zu sagen, daß der unkomplizierte Keuchhusten wohl durch sein Hustensymptom, nicht aber durch die Mächtigkeit seiner Lungenerscheinungen imponiert, mögen diese nun auskultatorisch und perkutorisch oder röntgenologisch geprüft worden sein. Diese Verhältnisse ändern sich, wenn der Keuchhusten eine eingetretene Komplikation durch das eitrige Sputum zeigt.“ Eine Meinung, der nur zuzustimmen ist. Davon abweichend glaubt Göttche allein im Röntgenbild ohne allzugroße Beachtung des klinischen Verlaufs, das wichtigste Diagnosticum des unkomplizierten Keuchhustens gefunden zu haben.

Mein Ziel ist daher die Ueberprüfung des röntgen-diagnostischen Wertes, der von Göttche beschriebenen Veränderungen.

Wir sind so vorgegangen, daß wir, ohne Berücksichtigung einer klinischen Diagnose sämtliche Röntgenaufnahmen auf die für die Keuchhustenlunge charakteristischen Veränderungen durchsuchten. Es fanden sich im ganzen 89 Fälle, die das klassische Bild des „b a - s a l e n D r e i e c k s“ zeigen. Ein Vergleich mit dem klinischen Befund ergibt überraschenderweise nur 42 Fälle mit der klinischen Diagnose Pertussis. Aus dem klinischen Verlauf dieser 42 Fälle ist einwandfrei ersichtlich, daß sich 28 im Stadium convulsivum befinden, 10 das klinische Bild einer Keuchhustenpneumonie zeigen, und 4 Fälle in den Beginn des Stadiums decrementi fallen.

Die restlichen 47 Aufnahmen mit dem klassischen Bild des b a - s a l e n D r e i e c k s führen nicht die klinische Diagnose Pertussis, sondern lassen sich unter verschiedene Krankheitsbilder einreihen.

1. Fall (klinisch) Kind Karl Heinz H. 1 J. alt.

Am Tage vor der Einlieferung krampft das Kind. Erbrechen. Wird mit dem Verdacht auf Pneumonie eingewiesen.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Klopfschall regelrecht. Ueber beiden Lungen, be-

fonders über den abhängigen Partien reichlichst feine und mittelblasige Rasselgeräusche, die zum Teil fortgeleitet aus der Luftröhre stammen.

Klinische Diagnose: Recidivierende Bronchopneumonie bei ganz widerstandslosen schwer immunitätsgeschwächten Kind.

Röntgenbefund: Verschattung beiderseits in der Hilusregion, ist ziemlich weich und springt ins Lungengewebe vor. Beide Herzkonturen sind aufgewolkt. Der rechte Herzzwerchfellwinkel ist verschattet. In beiden Oberfeldern feinfleckige, weiche Schattenbildungen. Lungenrandlinie beiderseits deutlich. Ausgesprochene Lungenblähung.

Röntgendiagnose: langes Dreieck bei Lungenblähung und bronchopneumonischen Herden.

2. Fall (klinisch) Kind Anni P. 1 J. 2 Monate alt.

Husten und Erbrechen vor der Aufnahme. Atmet angestrengt, bekommt Hustenanfälle, soll Schleim hochbringen. Soll blau gewesen sein.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Klopfeschall regelrecht. Links hinten unten Atemgeräusch abgeschwächt. Klingende Rasselgeräusche beiderseits.

Klinische Diagnose: Doppelseitige Bronchopneumonie.

Röntgenbefund: Beiderseits aufgewolkte Herzkonturen. Zwischen der 6. und 8. Rippe ist ein etwa dreimarkstückgroßer Schattenherd sichtbar, der sich an die Herzgrenze anschließt und teilweise in Herzdeckung liegt. Etwa 1 querfingerbreites paravertebrales Schattenband, Trachea und die beiden Hauptbronchien deutlich zu sehen. Zwischen der 5. und 6. Rippe liegt ein kleiner dreiecksförmiger Schattenherd, der nach unten scharf begrenzt ist. Der Hilus ist beiderseits groß, weich verschattet.

Röntgendiagnose: Langes Dreieck bei Bronchopneumonie.

3. Fall (klinisch) Kind Gisela E. 4 Monate alt.

8 Tage vor der Aufnahme mit Husten und Fieber erkrankt, blaß, hustet krampfhaft, erbricht.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Sonorer Klopfeschall. Ueber beiden Lungen verstreut feltene, nicht klingende Rasselgeräusche. Vorn rechts in der

Mitte in dreimarkstückgroßer Ausdehnung zum Teil klingende, fast feinblasige Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie.

Röntgenbefund: Starke Lungenblähung. Herzschatten beiderseits aufgewolkt. Geht ohne scharfe Begrenzung ins Lungengewebe über, das neben dem Herzen ungleichmäßige Verschattung mit kleineren, zum Teil auch größeren Herdschatten aufweist. Herzzwerchfellwinkel beiderseits ausgefüllt. In beiden Lungenfeldern feinste Lungenzeichnung. Peribronchitische Herde oder bronchopneumonische Herde?

Röntgendiagnose: Langes Dreieck bei Bronchopneumonie.

4. Fall (klinisch) Kind Gisela W. 10 Wochen alt.

Kommt in bedrohlichem Zustand mit Atemnot, Nasenflügeln und Zyanose des Gesichts in die Klinik.

Lungenbefund: Keine sichere Klopfchalldifferenz. Ueber beiden Lungen zum Teil klingende, zum Teil nicht klingende Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie mit Lungenblähung.

Röntgenbefund: Steiltstellung beider Zwerchfelle. Das Herz ist deutlich nach links verlagert. Beide Herzkonturen sind aufgewolkt. Kleiner Spontanpneumothorax rechts oben. Unregelmäßige Verschattung im lk. Unterfeld.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie und Lungenblähung.

Daselbe Kind wird 1 Jahr später mit Läuseekzem aufgenommen und erkrankt plötzlich in der Klinik mit hoher Temperatur, Zyanose, Atembeschleunigung. Auf beiden Lungen bronchopneumonischer Befund.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie.

Röntgenbefund: Das rechte Zwerchfell steht höher als das linke, steigt von medial nach lateral ziemlich steil an. Der laterale Zwerchfellanteil geht ohne Grenzen in eine Verschattung des rechten Sinus-Phrenico-costalis über. Der Komplementärraum ist ausgefüllt. Der rechte Hilus ist fleckig, zeigt zum Unterfeld reichlich Strangzeichnung, die zum Teil fleckig ist. Herzkonturen beiderseits aufgewolkt. Schmales, paravertebrales Schattenband rechts. 2. verdickte Haarlinie in einem Winkel von ungefähr 30 Grad von der 1. abgehend, sodaß der Eindruck entsteht, daß es sich um den Rest eines Interlobärkeils handelt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie.

5. Fall (klinisch) Kind Horst K. 5 Jahre alt.

12 Tage vor der Einweisung hohes Fieber. In den letzten 3 Tagen dauernd schläfrig. Klagt häufig über Leibschmerzen. Angestrenzte Atmung.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Vorne über der ganzen linken Seite leicht abgeschwächter Klopfschall. An der rechten Axillar im Bogen von der Mammillarlinie ansteigend Dämpfung, die ziemlich intensiv ist. Hinten oben beiderseits geringe Schallabschwächung. Im lk. Unterlappen intensiver Dämpfungsbezirk.

Klinische Diagnose: Konfluierende Bronchopneumonie beiderseits.

Röntgenbefund: Rechts dreieckige Verschattung von dem fleckigen Hilus ins Unterfeld ausgehend und in die aufgewolkte rechte Herzkontur ohne Grenzen übergehend. Rechtes Unterfeld wenig lufthaltig. Fast das ganze linke Unterfeld ist eingenommen von einer ziemlich homogenen, weichen Verschattung, die ebenfalls zu einer Verwischung der lk. Herzkontur führt. Die Verschattung geht ohne Grenzen in den lk. fleckigen Hilus über.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie.

6. Fall (klinisch) Kind Sophie St. 5³/₄ Jahre alt.

Mit hohem Fieber, Husten, Nasenflügeln und beschleunigter Atmung erkrankt.

Lungenbefund: Beiderseits vorne und hinten Rasselgeräusche. Keine ausgesprochene Dämpfung über den Lungen. Klopfschall stellenweise verkürzt, stellenweise tympanitischer Beiklang. Oberflächliche Atmung, geringe Atemexcursionen.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie beiderseits.

Röntgenbefund: Herzkontur nicht erkennbar, völlig aufgewolkt, ebenso die Zwerchfellkonturen. Das ganze lk. Unterfeld ist bis zur Höhe der 5. Rippe von einer dichten, kleinfleckigen Verschattung eingenommen, die zur Peripherie hin sich aufhellt, zum Hilus hin sich ohne Grenzen in den dichten Herzschatten auflöst. In sämtlichen Lungenabschnitten reichlich Lungenzeichnung. Rechter Hilus groß, fleckig, löst sich nach unten hin in maschenförmige, grobe Strangzeichnung auf. An der Peripherie des rechten Mittelfeldes zwischen 5. u. 7. Rippe konfluierende bronchopneumonische Herde in einem etwa markstückgroßen Bezirk. Verdickte Haarlinie rechts.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie beiderseits.

7. Fall (klinisch) Kind Gisela G. 5 Jahre 4 Mon. alt.

Ein paar Tage vor der Aufnahme appetitlos, Husten, Schmerzen in der rechten Oberbauchseite beim Atmen. Am Tage der Einlieferung kurze Atmung, Nasenflügeln, Erbrechen. Einweisung als Pneumonie.

Intrakutanreaktion: negativ.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Hinten unten beiderseits reichlich mittelblasige und feinblasige klingende Rasselgeräusche bei rauhem puerilem Atmen. Keine Dämpfung.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie, Bronchitis.

Röntgenbefund: Deutliche Aufwolkung im Sinne einer Keuchhustenlunge mit Ausbildung eines basalen Dreiecks, das links auch das Zwerchfell mitbeteiligt. Auch das rechte Unterfeld erscheint wolkig getrübt, der rechte Hilus groß, paravertebrales Schattenband rechts mit Beteiligung der Pleura rechts.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie.

8. Fall (klinisch) Kind Wilhelm K. 4 Jahre alt.

Am Tage vor der Aufnahme aus voller Gesundheit mit Husten, Fieber und galligem Erbrechen erkrankt, Nasenflügeln.

Pirquet: negativ.

Lungenbefund: Klopffschall voll, links seitlich etwas abgeschwächt. Ueber beiden Lungen zähes Giemen und feines Rasseln. Lungen beiderseits gebläht.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie.

Röntgenbefund: Ausgesprochene Verbreiterung des Mittelschattens. Links bogenförmig begrenzt mit dichterem Kern einer ähnlichen Begrenzung. Starke Zeichnung ins rechte Oberfeld. Aufwolkung beider Herzränder. Beide Hili groß.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie.

9. Fall (klinisch) Kind Paul W. 6 Monate alt.

Seit 8 Tagen Husten. Manchmal Fieber. 1 Tag vor der Aufnahme Verschlimmerung des Hustens, soll hohes Fieber gehabt haben.

Lungenbefund: Lungen deutlich gebläht. Grenzen tieftehend. Ueber der lk. Lungenseite nur grobes Giemen und Brummen.

Rechts seitlich und hinten unten auch gröberes und feineres, teilweise klingendes Rasseln.

Klinische Diagnose: Bronchopneumonie. Blähungsbronchitis.

Röntgenbefund: Rechter Herzrand aufgewolkt, reichlich strängige Zeichnung nach dem Unterfeld, Herzzwerchfellwinkel verschattet. Auch vom lk. Hilus leichte Strangzeichnung ins Unterfeld. (basales Dreieck). Oberhalb des rechten Hilus eine etwa markstückgroße, fleckige Verschattung paravertebral. Das rechte Zwerchfell steigt medial ziemlich steil an, im lk. Hilus ein erbsengroßer, dichter Fleck.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchopneumonie.

II. Röntgenaufnahme nach 3 Wochen.

Röntgenbefund: Im wesentlichen unverändert. Herzrand rechts immer noch aufgewolkt. An den großen fleckigen Hilus rechts schließen sich zum Ober- und Unterfeld hin feinfleckig durchsetzte, konfluierende Verschattungsherde an.

10. Fall (klinisch) Kind Liselotte M. 2 Jahre alt.

In letzter Zeit schlechter Appetit, oft müde. Seit vielen Wochen Husten. Keine Nachtschweiß. 2 Geschwister tuberkulös, Mutter leidet an offener Lungentuberkulose.

Intrakutanreaktion: positiv.

Blutsenkungsgeschwindigkeit: 1 Std. 45 Min.

Blutbild:

Leukozyten: 9 200

Eo. 2,5%

Stab. 3,5%

Segment. 33%

Lympho. 58%

Mono. 3%

Lungenbefund: Grenzen tieffstehend. Keine sichere Schallverkürzung. Vorne beiderseits rauhes Atemgeräusch und etwas Brummen. Hinten über beiden Lungen, rechts mehr wie links, reichlich feines Giemen und Rasseln. Nach unten zu beiderseits feuchte, nicht klingende Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Lungentuberkulose.

Röntgenbefund: Reichlich vermehrte Lungenzeichnung in allen Feldern. Der rechte Hilus ist groß, fleckig infiltriert. Rechter Herzzwerchfellwinkel von einer fleckigen, unscharf begrenzten Ver-

fschattung mit reichlich Strangzeichnung eingenommen, die den rechten Herzrand aufwolkt. Auch links findet sich eine Aufwolkung des Herzrandes und neben dem Hilus einige dichtere Schattenflecke.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Lungentuberkulose.

11. Fall (klinisch) Kind Heinrich Friedrich S. 1 J. 4 Mon.

Vater und Mutter angeblich gesund. Ein Bruder der Mutter leidet an Lungentuberkulose. Mit 6 Monaten Keuchhusten. Seit 1 Jahr häufig Husten, seit 2 Tagen Stärkerwerden des Hustens. Das Kind fühlt sich heiß an. Am Tage vor der Einweisung treten Krämpfe auf. Der Arzt weist es zur Beobachtung ein.

Tuberkulinprobe: positiv.

Blutsenkungsgeschwindigkeit: 1 Std. 8 Min.

Lungenbefund: Keine Schallverkürzung. Ueber beiden Lungen, größtenteils rechts, grobes Rasseln, zum Teil mit Giemen untermischt. Rechts hinten Mitte sind knallende und klingende Geräusche zu hören. Die feinblasigen Geräusche treten wegen des Vorherrschens der grobblasigen zurück.

Klinische Diagnose: Tuberkulöses Infiltrat.

Röntgenbefund: Beiderseits breites paravertebrales Schattenband mit schwartiger Betonung. Vom Hilusgebiet abwärts ist beiderseits der Herzrand aufgewolkt durch eine ziemlich dichte Verschattung, die links das Interlobarium mitbeteilt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei tuberkulösem Infiltrat.

12. Fall (klinisch) Kind Franz R. 3 Jahre alt.

Mutter als Kind Lungen spitzenkatarrh. Das Kind wird von der Hautklinik, wo es wegen seines Ekzems in Behandlung ist, wegen rechtsseitiger Unterlappenpneumonie eingewiesen. Es neigt von jeher zu Katarrhen, fiebert leicht.

Pirquet: negativ.

Intrakutanreaktion: positiv.

Blutbild:

Eo. 1,5%

Stab. 8,5%

Segm. 30,5%

Lympho. 57,8%

Mono. 2,5%

Lungenbefund: Rechts hinten unten deutliche Schallverkürzung. Bei tiefem Atmen einzelne klingende Rasselgeräusche. Atemgeräusch wird abgeschwächt. Deutliches Reiben rechts unten, unweit der Wirbelfäule. Ueber der übrigen Lunge bronchitische Geräusche.

Klinische Diagnose: Sekundärtuberkulose, trockene Pleuritis. Allergie.

Röntgenbefund: Herzkontur beiderseits aufgewolkt. Rechter Herz-zwerchfellwinkel ausgefüllt. Große Hili. Deutliches basales Dreieck. Haarlinie rechts, Lungenrandlinie beiderseits sichtbar. Rechts paravertebral vom großen Hilus sich nach aufwärts erstreckend weiche Verschleierung.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Sekundärtuberkulose.

13. Fall (klinisch) Kind Katharina E. 4 Jahre alt.

Wird wegen seit 1 Jahr bestehender Blepharitis, Konjunctivitis und Keratitis skrophulosa und Blepharospasmus am lk. Auge eingewiesen. Erkältet sich leicht, hat auch jetzt wieder Husten, keine Nachtschweiße. Die übrigen Familienangehörigen angeblich gesund.

Intrakutanreaktion: positiv.

Blutlenkungsgeschwindigkeit: 50 Min.

Lungenbefund: Sonorer Klopffschall, überall Bläschenatmen. Links hinten 1 Querfinger unter dem Schulterblattwinkel etwas rauhes Atmen.

Klinische Diagnose: Skrophulose.

Röntgenbefund: Beide Hili dicht verschattet, groß, gegen das Lungengewebe abgesetzt, Stränge nach abwärts. Haarlinie nicht sichtbar. Herzrand beiderseits aufgewolkt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei tuberkulöser Infiltration.

14. Fall (polyklinisch) Kind Karl Heinz K. 5 Jahre alt.

Seit längerer Zeit stärkerer Husten. Schleim wird nicht hochgebracht. Kein Erbrechen. Keine Nachtschweiße. Wird zur Röntgenaufnahme geschickt.

Blutlenkungsgeschwindigkeit: 2 Std. 38 Minuten.

Moro: positiv.

Lungenbefund: Zähes Giemen beiderseits. Rechts oben hinten etwas feuchtes Rasseln. Keine Klopffchalldifferenz.

Poliklinische Diagnose: Z. B. Tuberkulose.

Röntgenbefund: Herzkonturen aufgewolkt. Der rechte Herz-zwerchfellwinkel von einer rundlichen, schlecht abgrenzbaren Verschattung ausgefüllt, in deren Zentrum ein länglich runder, kirschkerngroßer Schatten sich absetzt. Ist angedeutet strukturiert, zeigt aber keine Kalkeinlagerungen. Von diesem Gebiet zieht schräg durch den 7. I.K.R. nach abwärts eine deutlich abgesetzte Schattenlinie. (Schwarte). Die Umgebung der beiden Hili ist etwas weicher als sonst gezeichnet. Paravertebraler Schatten rechts, Lungenrandlinie beiderseits erkennbar. Begleitschatten zur 2. Rippe, Haarlinie schwach sichtbar.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Tuberkulose.

15. Fall (poliklinisch) Kind Margot R. 5 Jahre alt.

Schwester der Mutter lungenleidend. Vor Jahren wegen Drüsentuberkulose und Hilusdrüsentuberkulose in Behandlung. Seit 14 Tagen Appetitlosigkeit und Husten. Temperatur 37,0 Grad.

Lungenbefund: nichts Pathologisches.

Poliklinische Diagnose: Tuberkulose, zur Röntgenkontrolle eingewiesen.

Röntgenbefund: Die lk. Herzkontur ist aufgewolkt, Vorhof und Ventrikel bilden fast eine Linie. Auch rechts ist die Herzkontur unscharf und geht in eine dreieckige inhomogene Verschattung über. Darüber erkennt man ein etwa fingerbreites, paravertebrales Schattenband ohne Kalkschatten. Links im 8. I.C.R. hinten einen innen aufgehellten, im übrigen kalkdichten Schatten, von etwa Erb-fenggröße. Im selben I.C.R. ist, überdeckt vom Herzschatten, ein etwas größerer, unregelmäßig strukturierter Kalkschatten sichtbar. Im Bereiche des Hilus ein kirschkerngroßer, weicher Schatten, außerdem einige stecknadelkopfgroße in feiner Nachbarschaft.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei sekund. Tuberkulose.

16. Fall (Lungenfürsorge) Kind Georg M. 10 Jahre alt.

Mutter lungenleidend. Wird wegen Brustschmerzen in der Gegend des Brustbeins und Kopfschmerzen in die Poliklinik gebracht.

Intrakutanreaktion: positiv.

Lungenbefund: Klopfschall regelrecht. Links hinten unten vereinzelt klingende Rasselgeräusche, ebenso rechts am Hilus.

Klinische Diagnose: Z. B. Tuberkulose.

Röntgenbefund: Haarlinie rechts, das Herz ist ziemlich stark nach rechts gelagert. Seine Konturen sind beiderseits aufgewolkt, rechts mehr als links. Verschattung im Herz-zwerchfellwinkel. Von beiden Hili, rechts stärker als links, strängige Verschattung ins Unterfeld. Der Mittelschatten erscheint rechts verbreitert. Im rechten und linken Oberfeld Verdacht auf einzelne kleine Herdschatten.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Sekundärtuberkulose mit rückgängiger Infiltration rechts unten.

17. Fall (klinisch) Kind Marianne Sch. 4 $\frac{1}{2}$ Jahre alt.

Mutter und eine Schwester der Mutter an Tuberkulose gestorben. Wird wegen Husten und zeitweiser Temperaturerhöhung aufgenommen. Auch hat es an Gewicht abgenommen und schwitzt nachts.

Intrakutanreaktion: positiv.

Blutsenkungsgeschwindigkeit: über 4 Stunden.

Lungenbefund: Ueber der ganzen lk. Lungenseite rauhes Atmen. Links hinten unten Schallverkürzung, in deren Bereich einige feuchte, nicht klingende Rasselgeräusche zu hören sind.

Klinische Diagnose: Sekundärtuberkulose. Bronchitis.

Röntgenbefund: Paravertebral im rechten Unterfeld bis zum Hilus hinauf, eine weiche, vom Herzschatte nicht abgrenzbare Verschattung. Die Herzkonturen sind aufgewolkt, der Herz-zwerchfellwinkel verschattet. Auf der Grenze zwischen lk. Hilus und Lungengewebe fallen 2 gut stecknadelkopfgroße, härtere Schatten auf.

II. Röntgenaufnahme 9 Tage später.

Deutliche Aufhellung sowohl des rechtsseitigen paravertebralen Schattens, als auch der diffusen linksseitigen Unterfeldverschattung. Es ist auf beiden Seiten noch weiche, vermehrte Zeichnung in den Bezirken der ehemaligen Verschattung zu erkennen, mit Einlagerung einzelner linsengroßer dichter Flecken, besonders rechts. Der lk. Komplementärraum erscheint jetzt ausgefüllt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Sekundärtuberkulose mit Pleurabeteiligung.

18. Fall (klinisch) Kind Kurt K. 6 Jahre alt.

Der aus einer mit Tuberkulose belasteten Familie stammende Junge wird wegen häufigen Hustens, blassen Aussehens und schlechten Appetits in der Poliklinik vorgestellt.

Moro: positiv.

Blutsenkungsgeschwindigkeit: 20 Minuten.

Lungenbefund: Lungen gut verschieblich, nirgends sichere Schallverkürzung, pueriles Atmen.

Klinische Diagnose: Tuberkulöse Infiltration im lk. Unterlappen.

Röntgenbefund: Der Herzrand ist beiderseits aufgewolkt, der Hilus beiderseits groß. Herzzwerchfellwinkel ausgefüllt. Deutliche Lungenrandlinie rechts. Infiltration im lk. Unterfeld. Von dem rechten vergrößerten Hilus aus ziemlich derbe Strangzeichnung nach dem Unterfeld. Unschärfe Haarlinie. Im 6. I.C.R. links, teilweise in Deckung der 7. Rippe, liegt ein gut linsengroßer Aufhellungsbezirk, der von einer schmalen, unscharf begrenzten Schattenzone umgeben ist. Phrenico-costalwinkel links ausgefüllt. Strukturierter Kalkschatten zwischen der 7. und 8. hinteren Rippe links.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei tuberkulösem Infiltrat.

19. Fall (klinisch) Kind Irene B. 4 Jahre 4 Mon. alt.

1 Schwester des Vaters an Tuberkulose gestorben. 4 Wochen vor der Aufnahme Husten, kein Fieber. Seit 14 Tagen Temperatur bis 39 Grad. Dabei starkes Schwitzen und Erbrechen. Nachts mehr Husten als am Tage. Hat an Gewicht abgenommen.

Intrakutanreaktion: positiv.

Blutsenkungsgeschwindigkeit: 75 Min.

Lungenbefund: Voller Klopffschall über der ganzen Lunge. Fein bis grobblasiges Rassel, in den abhängigen Partien vermischt mit Giemen und Brummen.

Klinische Diagnose: Ältere Hilusdrüsentuberkulose. Akuter Racheninfekt.

Röntgenbefund: Links im oberen Hilusteil und paravertebral liegen mehrere kalkdichte Krümelschatten. Rechts ist der Hilus mäßig verbreitert, auch abwärts davon ist der ganze Epsteinsche Winkel von einer deutlichen inhomogenen Verschattung ausgefüllt. In ihr erkennt man 3 rundliche, stecknadelkopfgroße Schattenflecke. Beide Herzkonturen sind deutlich aufgewolkt. Eine Lungenrandlinie ist nicht sicher zu erkennen. Begleitschatten zur 2. Rippe deutlich.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Tuberkulose.

20. Fall (polyklinisch) Kind Gretel A. 9 Jahre alt.

Seit 1 Jahr Husten, der nach einer Lungenentzündung schlimmer

wurde, dauernd anhält und von kurzen hustenfreien Wochen unterbrochen ist. Keine Nachtschweiß. Wird zwecks Anfertigung eines Röntgenbildes geschickt.

Blutienkung: 3 Stunden 55 Min.

Lungenbefund: Grenzen normal verschieblich, rechts mehr als links. Links hinten unten und seitlich sowie auch über der Spitze ganz leichte Schallverkürzung. Ebenfalls links hinten unten und seitlich abgeschwächtes Atmen. Ueber der rechten Spitze hinten und vorne nach Hustenstößen vereinzelt Giemen.

Poliklinische Diagnose: Chron. Bronchitis. Z. B. Tuberkulose.

Röntgenbefund: Beide Herzränder, links mehr als rechts, deutlich aufgewolkt. Linker Komplementärraum ausgefüllt. Es entsteht das typische Bild des basalen Dreiecks. Begleitichatten zur 2. Rippe beiderseits. Verdickte Haarlinie rechts.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

21. Fall (klinisch) Kind Liesel H. 4 Jahre alt.

Schon wiederholt Bronchitis. Wieder mit Husten und Fieber erkrankt.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Ueber beiden Lungen mittelblasige Rasselgeräusche. Hinten paravertebral, besonders in den unteren Partien, feuchtes Rasseln, Giemen auch in den vorderen Lungenpartien.

Klinische Diagnose: Chron. Bronchitis.

Röntgenbefund: Hilus rechts schmal. Herzkonturen beiderseits aufgewolkt, Herzzwerchfellwinkel rechts verschattet. Basales Dreieck. Zwerchfellhochstand. Expirationsstellung. Haarlinie rechts angedeutet.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

22. Fall (klinisch) Kind Gertrud H. 5 Jahre alt.

Starke Neigung zu Katarrh mit Husten. Kommt zur Beobachtung auf Tuberkulose. Nach Angabe der Fürsorgegeschwester hustet das Kind seit langem.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Regulärer Klopffschall, pueriles Atmen, links hinten unten feines Giemen, zeitweise vereinzelt Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Chron. Bronchitis.

Röntgenbefund: Fleckige Hili beiderseits, verdickte Haarlinie rechts. Linke Herzkontur aufgewolkt, linker Herzzwerchfellwinkel und Komplementärraum ausgefüllt. Vom rechten Hilus Strangzeichnung in das rechte Unterfeld mit Ausfüllung des Herzzwerchfellwinkels. Deutliche Aufwolkung des rechten Herzrandes.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

23. Fall (klinisch) Kind Karl G. 11 Jahre alt.

Vom Arzt mit dem Verdacht auf Hilusdrüsentuberkulose eingewiesen, da seit Monaten Husten besteht, manchmal Fieber vorhanden ist und die Temperatur nach dem Typus inversus am Morgen höhere Werte als am Abend zeigt.

Tuberkulinprobe: negativ.

Blutlenkungsgeschwindigkeit: 7 Std. 15 Min.

Lungenbefund: Rechts in dem unteren Teil der Axilla geringe Schallverkürzung. Sonst überall beiderseits gleicher sonorer Klopfeschall. Links vorne unten vereinzeltes grobes Brummen. Ueber den unteren Lungenpartien etwas abgeschwächtes Atmen.

Klinische Diagnose: Chron. Bronchitis und Tonfillitis hypertrophicans. Infektion der oberen Luftwege.

Röntgenbefund: Lungenfelder hell und frei von Herdschatten, beide Hili zu den Unterfeldern in reichlich Strangzeichnung übergehend. Herzzwerchfellwinkel verschattet. Herzkonturen unscharf, beiderseits aufgewolkt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

24. Fall (klinisch) Kind Gertrud W. 3½ Jahre alt.

Leidet seit seinem 1. Lebensjahr im Anschluß an Keuchhusten an im Frühjahr und Herbst wiederkehrenden Hustenattacken. Hustet hauptsächlich nachts. Hustenperiode meist ohne Fieber, dauert 3—4 Wochen an, um dann im nächsten Frühjahr oder Herbst wiederzukommen.

Intrakutanprobe: negativ.

Lungenbefund: Ueber beiden Lungen unreines, leises Atmen. Beiderseits hinten unten kleinblasige, feuchte Rasselgeräusche. Auch paravertebral vereinzelte Rasselgeräusche. Heller Klopfeschall.

Klinische Diagnose: Chron. Bronchitis seit einem 3 Jahre zurückliegenden Keuchhusten. Verdacht auf Bronchiektasen.

Röntgenbefund: Aufgewolkte Herzkonturen beiderseits, Verschattung des Herzzwerchfellwinkels rechts, in der Nähe des rechten Hilus fallen mehrere stecknadelkopfgroße, rundliche Flecken auf. Haarlinie angedeutet. Begleitschatten zur 2. Rippe.

II. Röntgenaufnahme: Am Tage der Entlassung.

Röntgenbefund: Das basale Dreieck ist immer noch zu sehen.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis mit Bronchiektasenverdacht.

25. Fall (klinisch) Kind Gustav L. 3 Jahre alt.

Seit Monaten Husten von wechselnder Intensität, meist nachts. Erbricht gelegentlich dabei Schleim. Auch morgens Aushusten von Schleimbrocken.

Moro: negativ.

Die Untersuchung des Auswurfes ergibt nichts Besonderes.

Lungenbefund: Ueberall sonorer Klopffschall. Ueber dem rechten Oberlappen hinten auffallend rauhes Atmen, verlängertes Exspirium, reichlich feine, mittelblasige Rasselgeräusche. Ueber beiden Unterlappen, besonders aber rechts, reichlich grob- und mittelblasige Rasselgeräusche, sowie auch rechts Giemen. Ueber den vorderen Lungenpartien reichlich bronchitische Geräusche.

Klinische Diagnose: Chron. Bronchitis. Verdacht auf Bronchiektasen.

Röntgenbefund: Das rechte Zwerchfell erscheint aufgelockert und unscharf begrenzt, im ganzen abgeflacht. Vermehrte Strangzeichnung vom Hilus ins Unterfeld, hauptsächlich rechts. Aufwolkung der rechten Herzkontur. Beide Hili flächig mit einigen dichten Flecken durchsetzt. Ausfüllung beider Komplementäräume. Auch die lk. Herzkontur ist aufgewolkt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis. Geringe Pleuritis beiderseits.

26. Fall (polyklinisch) Kind Liselotte B. 4 Jahre alt.

Seit längerer Zeit Husten, der oft stundenlang anhält. Kein Ziehen, keine Zyanose. Wird zur Röntgenaufnahme hereingebracht.

Intrakutanreaktion: negativ.

Lungenbefund: Links hinten unten und rechts vorne einige mittel- bis großblasige Rasselgeräusche. Vereinzelt Giemen. Keine Klopfschalldifferenz.

Poliklinische Diagnose: Chron. Bronchitis.

Röntgenbefund: Beide Hili groß, flächenhaft, ziemlich dicht. Es zieht von ihnen reichlich Strangzeichnung nach den Unterfeldern. Herzrand beiderseits aufgewolkt. Herzzwerchfellwinkel ausgefüllt. Beide Unterfelder, besonders das rechte, sind ziemlich stark tüpfelig, strängig gezeichnet. Schmales paravertebrales Schattenband.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

27. Fall (poliklinisch) Kind Marg. B. 3 Jahre alt.

Seit einem Jahr mit Unterbrechung Husten, der nicht anfallsweise auftritt. Kein Erbrechen, kein Ziehen.

Moro: negativ.

Blutlenkungsgeschwindigkeit: 5 Stunden.

Lungenbefund: Keine Klopfchalldifferenz. Ueber den unteren Lungenpartien verschärftes Atmen, ab und zu Giemen.

Poliklinische Diagnose: Chron. Bronchitis.

Röntgenbefund: Ausgesprochen basales Dreieck. Etwas vorspringender linker Hilus. Begleitschatten zur 2. Rippe.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Bronchitis.

28. Fall (klinisch) Kind Etfriede O. 8 Jahre alt.

Das Kind wird mit hoher Temperatur (39,1 Grad) und verstärkter, beschleunigter Atmung eingeliefert. 14 Tage vor der Einlieferung mit Husten und Fieber erkrankt.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Ueber beiden Lungen grobe Rasselgeräusche, am stärksten über beiden Unterlappen. Beiderseits hinten unten expiratorisch und inspiratorisch großblasige Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Grippe.

Röntgenbefund: Beiderseits in den Unterfeldern von den Hili ausgehend, an den Herzkonturen aufsitzend und bis zum Herzzwerchfellwinkel reichend, wolkige, weiche, dreieckige Verschattung, basales Dreieck. Rechts leicht verdickte Haarlinie. Links breite Lungenrandlinie, rechts schmaler Begleitschatten zur 2. Rippe.

Röntgenriagnose: Basales Dreieck bei Grippe.

29. Fall (klinisch) Kind Maria G. 5 Jahre 9 Monate alt.

Erbricht seit 5 Tagen, klagt über Kopfschmerzen, hustet. Seit 3 Tagen verwaschene Sprache, kennt die Eltern nicht mehr recht.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Unten paravertebral leichte Schallverkürzung, darunter ausgesprochenes Bronchialatmen mit wenigen, klingenden Rasselgeräuschen. Rechts hinten, unterhalb des unteren Skapulaanatzes ist das Atemgeräusch verschärft, man hört einige klingende Rasselgeräusche. Bronchophonie.

Klinische Diagnose: Grippe-Pneumonie und Encephalitis.

Röntgenbefund: Bogenförmig begrenztes paravertebrales Schattenband rechts. Der Herzrand ist beiderseits, links mehr als rechts, von einer weichen, unregelmäßigen Verschattung aufgewolkt, die die Herzzwerchfellwinkel ausfüllt und links auch in den Komplementärraum hineinreicht. Zwischen 5. und 6. Hinterrippe, rechts scharf randig abschneidend, beginnt eine nur in den peripheren Partien deutliche, ziemlich homogene Verschattung, die bis zur 3. Rippe reicht.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Grippe.

30. Fall (klinisch) Kind Wolfgang D. 1 Jahr 4 Mon. alt.

4 Tage vor der Aufnahme Husten und Appetitlosigkeit. Der Husten ist etwas bellend und abends am stärksten. Auch leichte Temperaturen wurden festgestellt. Das Kind wird wegen fieberhaften Bronchialkatarrhs eingewiesen.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Heller Klopffschall, pueriles Atmen, zahlreiches Giemen, vereinzelt Brummen, zahlreiche, feuchte, mittelblasige Rasselgeräusche. Geringer expiratorischer Stridor.

Klinische Diagnose: Grippe.

Röntgenbefund: Herzschatten beiderseits aufgewolkt, sodaß es zur Bildung eines basalen Dreiecks kommt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Grippe.

31. Fall (poliklinisch) Kind Marie St. 9 $\frac{1}{2}$ Jahre alt.

Hat seit einer überstandenen Grippe Husten, Auswurf und Nachtschweiß. Wird deshalb in die Poliklinik gebracht.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Klopffschall regelrecht, über beiden Unterlappen reichlichst feuchte, fein- bis mittelblasige Rasselgeräusche u. Ronchi.

Poliklinische Diagnose: Grippe.

Röntgenbefund: Vom rechten Hilus aus erstreckt sich bandförmig mit unscharfen Grenzen eine Verschattung bis zum Zwerchfell, die die rechte Herzkontur aufwolkt. Auch links ist die Herzkontur etwas aufgewolkt, mit befenreiserartiger Strangzeichnung. Der Mittelschatten erscheint rechts paravertebral gering verbreitert.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck nach Grippe.

32. Fall (poliklinisch) Kind Hermann H. 9 Jahre alt.

Vor 3 Wochen Grippe mit Fieber, Husten und Schnupfen. Seit 8 Tagen wieder Husten und Fieber, reichlich schleimiger Auswurf. Kein Ziehen. Wird zur Röntgenaufnahme gebracht.

Intrakutanprobe: negativ.

Blutlenkungsgeschwindigkeit: 33 Min.

Lungenbefund: Keine Klopfchalldifferenz. Sehr leises Atemgeräusch. Hinten beiderseits einige feuchte Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Grippe.

Röntgenbefund: Beide Hilii flächenhaft vergrößert, Herzkonturen beiderseits verwachsen. Herzzwerchfellwinkel ausgefüllt. Im rechten Hilus sind wenige bis gut linsengroße zum Teil in Rippendekung liegende, dichtere Herde sichtbar. Im lk. Hilus einige ebenfalls bis linsengroße dichte Schatten. Haarlinie nicht sichtbar. Begleitschatten zur 2. Rippe. Ausgefüllter Komplementärraum links. Das Herzgefäßband wird links von einem bogenförmig, flach begrenzten Schatten überschritten, aus dem sich ein dichterer klein bohngroßer Herd hervorhebt, der am oberen Rand kalkdicht zu sein scheint.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck nach Grippe.

33. Fall (poliklinisch) Kind Margot E. 3 Jahre alt.

3 Monate vor der Einweisung schwere Grippe, hustet jetzt immer noch und hat auch etwas Auswurf.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Ueber beiden Lungen reichlich bronchitische Geräusche, keine Klopfchalldifferenz.

Poliklinische Diagnose: Grippefolgen.

Röntgenbefund: Sichtbare Schattenlinie neben der Wirbelfäule, die zwischen der 6. und 9. Rippe hinten schräg nach oben außen verläuft. Beide Hilien erscheinen groß und gehen nach unten beider-

feits in ein ausgebildetes, typisches basales Dreieck über, in dem der Herzschatten völlig untergeht. Der lk. Phrenico-costalwinkel ist ausgefüllt. Das lk. Zwerchfell steht etwas höher als das rechte und hat unscharfe Konturen.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei pleuritischen Resten nach Grippe.

34. Fall (klinisch) Kind Hans R. 4 Jahre 9 Monate alt.

Seit $1\frac{1}{2}$ Monaten Husten, Atembeschwerden. Dabei ab und zu Fieber zwischen 38 und 39 Grad. Bei Witterungsumschlag immer Anfälle von Atemnot und Husten. Kein Auswurf.

Intrakutanprobe: negativ.

Blutbild:

Leukoz. 13 400

Reizformen $1\frac{0}{0}$

Eo. $10,5\frac{0}{0}$

Stab. $7\frac{0}{0}$

Segment $36\frac{0}{0}$

Lympho. $40\frac{0}{0}$

Mono. $5,5\frac{0}{0}$

Lungenbefund: Sonorer Klopffschall. Ueber beiden Lungen reichlich mittelblasige und grobblasige Rasselgeräusche und Brummen.

Klinische Diagnose: Asthma bronchiale.

Röntgenbefund: Paravertebral vom rechten Hilus nach abwärts gehend gut 1 querfingerbreite weiche Verschattung, die sich im oberen Teil gut gegen das Lungengewebe absetzt, im Unterlappen den Herzzwerchfellwinkel ausfüllt und nach lateral in eine weiche, an einem Unterlappenbronchialast entlangziehende Strangbildung übergeht. Auch der lk. Hilus springt ins Lungengewebe vor, ist härter gezeichnet als der rechte und löst sich ebenfalls zum Unterfeld hin in weiche Stränge auf. Die Herzkonturen sind beiderseits aufgewolkt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Asthma bronchiale.

35. Fall (polyklinisch) Kind Liselotte B. 3 Jahre alt.

Hustenanfälle von 12 Stunden Dauer, Atemnot. Das Kind ist nervös und hat schon als Säugling Hautausschläge gehabt.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Reines Bläschenatmen. Keine Schallverkürzung.

Poliklinische Diagnose: A s t h m a b r o n c h i a l e , Nasopharingitis.

Röntgenbefund: Sehr reichlich vermehrte Lungenzeichnung in allen Feldern. Zahlreiche kleinfleckige Herdchen in beiden Unterfeldern, besonders den Bronchien entlang verlaufend. Beide Hili sind groß und infiltriert. Mantelartige, fleckige Verschattung beiderseits neben dem Herzen in die Unterfelder ausstrahlend und den Herzschatten beiderseits aufwolkend. Haarlinie rechts.

Röntgendiagnose: B a s a l e s D r e i e c k bei Asthma bronchiale.

36. Fall (klinisch) Kind Mariechen U. 9 Jahre alt.

Mit 6 Monaten Keuchhusten, seit dieser Zeit sehr empfindlich gegen Erkältung, ein Husten löst den anderen ab. Oefters Anfälle von Atemnot. Bei der Einlieferung subfebrile Temperatur.

Moro: positiv.

Blutflussgeschwindigkeit: 4 Stunden.

Blutbild:

Eo. 3,5%

Stab. 8%

Segmk. 41%

Lympho. 45,5%

Mono. 1,5%

Reizformen 0,5%

Lungenbefund: Ueberall sonorer Klopfschall, beiderseits in den abhängigen Partien grobes und feines Brummen, mittelblasige, feuchte Rasselgeräusche, die auf Husten verschwinden.

Klinische Diagnose: A s t h m a (Ueberempfindlichkeit gegen Tierhauschuppen des Hundes) allergische Bronchitis.

Röntgenbefund: Langer, schmaler Thorax. Tiefstehende Zwerchfelle, langgestreckter Herzschatten. Die Herzkonturen sind beiderseits aufgewolkt, deutliche Strangzeichnung von den vergrößerten und vermehrt gezeichneten Hili in die Unterfelder, typisches basales Dreieck. Beide Hili zeigen bis kerngroße Schattenflecke. Im rechten Mittelfeld erscheint das Lungengewebe weniger lichtdurchlässig und weist vermehrte Zeichnung auf, die auch in sämtlichen anderen Lungenpartien sichtbar, jedoch weniger deutlich ist.

2. Röntgenaufnahme 1 Tag vor der Entlassung.

Das basale Dreieck besteht immer noch.

Röntgendiagnose: B a s a l e s D r e i e c k bei Asthma.

37. Fall (Lungenfürsorge) Kind Erwin Sch. 8 Jahre alt.

Wird wegen starkem Husten, der fast die ganze Nacht andauert, in die Lungenberatung gebracht.

Blutfenkungsgeschwindigkeit: 2 Std. 20 Min.

Eosinophile Leukozyten: 12,5%

Lungenbefund: Leiser Stridor, über beiden Lungen Giemen und Brummen.

Poliklinische Diagnose: Asthma.

Röntgenbefund: Sehr intensive Hiluszeichnung beiderseits mit massiven, unregelmäßigen Kalkeinlagerungen. Reichlich Strangzeichnung in beiden Herzzwerchfellwinkeln, verknüpft mit reichlich kleinen Schattenfleckchen, die bis in den Komplementärraum hineinreichen. Beide Herzzwerchfellwinkel sind im besonderen ausgefüllt. Aufgewolkte Herzkonturen, Haarlinie rechts, Trachealschatten rechts.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Asthma.

38. Fall (klinisch) Kind Alfred B. 7 Jahre alt.

Am 3. Tage nach Ausbruch eines Masernexanthems wegen Meningitisverdacht eingewiesen. Bei der Aufnahme deutliche Reste eines Masernexanthems. Bellender Husten. Keine Hustenanfälle, kein Ziehen. Keine Anzeichen für Meningitis.

Intrakutanprobe: negativ.

Lungenbefund: Ueber beiden Lungen vereinzelt bronchitische Geräusche. Keine Klopfchalldifferenz.

Klinische Diagnose: Masern.

Röntgenbefund: Deutliches basales Dreieck. Herzzwerchfellwinkel ausgefüllt. Dem lk. Zwerchfell ist ein etwa fingerbreiter, dichter Schatten aufgelagert. Der lk. Phrenico-costalwinkel ist ausgefüllt. Knapp 1 querfingerbreites, paravertebrales Schattenband rechts, links $\frac{1}{2}$ querfingerbreit. Trachealbegleitschatten links.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Masern.

39. Fall (klinisch) Kind Ferdinand B. 7 Jahre 5 Mon. alt.

3 Monate vor der Aufnahme schon einmal wegen Masern in der Klinik gelegen. Neuerliche Aufnahme wegen verstärktem Husten, der seit den Masern besteht. Keine Hustenanfälle.

Intrakutanprobe: positiv.

Blutlenkungsgewindigkeit: 30 Minuten.

Lungenbefund: Auskultatorisch und perkutorisch frei.

Klinische Diagnose: Lungenveränderungen nach Masern.

Röntgenbefund: Typisches basales Dreieck. Ausgefüllte Herzzwerchfellwinkel. Im rechten Hilus ein dichter Fleck, darüber ein kirschkerngroßer, runder Schatten mit betontem Rand. Auch im lk. Hilus sind einige dichter gezeichnete Flecke zu erkennen. Vermehrte Strangzeichnung nach beiden Oberfeldern, besonders nach dem linken. Deutlich vorspringender Aortenknopf und Aorta descendens. Schmales paravertebrales Schattenband.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck nach Masern.

40. Fall (klinisch) Kind Liselotte T. 2½ Jahre alt.

4 Tage vor der Aufnahme mit katarrhalischen Erscheinungen erkrankt. 3 Tage später Ausbruch eines typischen Masernexanthems. Bei der Aufnahme voll ausgebildetes Masernexanthem. Koplik'sche Flecken.

Lungenbefund: Keine Klopfchalldifferenz. Beiderseits deutliche Bronchophonie. Vereinzelt klingende Rasselgeräusche. Beiderseits reichlich Giemen. Vereinzelt grobe Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Masern.

Röntgenbefund: Die Herzkontur ist aufgewolkt. Ein basales Dreieck sichtbar. Der rechte Herzzwerchfellwinkel ist ausgefüllt. In der ganzen rechten Lunge besonders im Unterlappen zartfleckige Zeichnung, die nach oben etwas tüpfelig wird. Im lk. Unterfeld ist eine gut 5-markstückgroße Verschattung sichtbar, die sich direkt dem Herzrand aufsetzt. Leichtes Vorspringen des lk. Vorhofbogens. In Höhe des rechten Hilus einige wenig dichte bis gut linien große Schattenflecke. Schräg verlaufende Haarlinie. Tiefstand der Zwerchfelle.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Masern.

41. Fall (klinisch) Kind Erna T. 1½ Jahre alt.

Vor 2 Monaten Masern. Hustet seit dieser Zeit. Es besteht Verdacht auf Bronchiektasen, wird deshalb aufgenommen.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Hinten unten beiderseits reichlich Schnurren, Brummen und Giemen und einzelne mittel- bis großblasige Rasselgeräusche auf beiden Lungen.

Klinische Diagnose: Chronische Bronchitis, Bronchiektasenverdacht.

Röntgenbefund: Beide Herzkonturen stark aufgewolkt, Herz-zwerchfellwinkel ausgefüllt. Typisches basales Dreieck. Der rechte Herzrand geht in einen 1 querfingerbreiten gegen das übrige Lungengewebe scharf abgesetzten Schatten mit leicht wolkiger Zeichnung über. Auch der lk. Herzrand geht in eine ziemlich dichte Verschattung über, die das lk. Unterfeld teilweise ausfüllt. Darin einige bis bohnen große Aufhellungen und Wabenstruktur.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck nach Maern und bei Verdacht auf Bronchiektasen.

42. Fall (poliklinisch) Kind Walter W. 8 Jahre alt.

Mit 2 Jahren Keuchhusten und Maern. Früher schon ca. 10 mal an Pneumonie erkrankt. Seit 4 Wochen Husten. Nachtschweiß und Appetitlosigkeit, hustet besonders morgens viel Schleim aus.

Intrakutanprobe: negativ.

Lungenbefund: Voller Klopffhall. Pueriles Atmen, über der r. Spitze, nach Husten Knacken. Grenzen etwas tieffstehend.

Poliklinische Diagnose: Verdacht auf Bronchiektasen.

Röntgenbefund: Beide Herzkonturen aufgewolkt. Geradlinig begrenzte, von der Clavicel bis fast zum Zwerchfell rechts ziehende, oben 1 unten $1\frac{1}{2}$ Finger breite Verschattung, die vom Herzschatten nicht zu trennen ist. Ihre unterste Partie zeigt keinen scharfen Rand mehr und geht in die wolkige Lungenverschattung über. Beide untere Lungenfelder reichlich durchzeichnet und weich, wolkig verschattet, Wabenstruktur. Beide Hili sind dichter als normal und weisen bis linsengroße Einlagerungen auf. Links erkennt man peripher im Lungenfeld 3 stecknadelkopfgroße, dichte Schattenflecke, rechts 1—2. Der linke Sinus Phrenico-costalis ist teilweise ausgefüllt, ebenso der rechte. Herzzwerchfellwinkel ausgefüllt.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchiektasen.

43. Fall (poliklinisch) Kind Arthur Sch. 10 Jahre alt.

Schon seit längerer Zeit an sich wiederholendem Bronchialkatarrh erkrankt, wird das Kind zur Röntgenaufnahme in die Poliklinik gebracht.

Tuberkulinprobe: negativ.

Blutfenkgeschwindigkeit: 26 Minuten.

Poliklinische Diagnose: Z. B. Tuberkulose.

Röntgenbefund: Hilus links groß, unscharf abgesetzt, reichlichst Lungenzeichnung. Hilus r. flächig, ziemlich gut abgesetzt. Der Herzzwerchfellwinkel rechts ist von einer ungleichmäßigen, wolkigen, dem Herzrand nahen, intensiven Verschattung ausgefüllt, die eine dreieckige Form hat. Der rechte Komplementärraum zwischen Zwerchfell und Rippen ist homogen verschattet. Linker Herzrand aufgewölkt, Ausfüllung des linken Herzzwerchfellwinkels. In beiden Unterfeldern angedeutete Wabenstruktur.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Bronchiektasen.

44. Fall (klinisch) Kind Margarete M. 3 Jahre alt.

Acht Tage vor der Aufnahme mit Husten erkrankt, der an Stärke zunahm. Am Tage vor der Aufnahme plötzlich 41 Grad Fieber. Wird wegen Verdacht auf Pneumonie eingewiesen.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Grenzen normal, rechts hinten Mitte bis unten einzelne, nicht klingende Rasselgeräusche. Links hinten paravertebral selten Giemen. Keine Klopfchalldifferenz.

Klinische Diagnose: Paravertebrale Pneumonie. Bronchitis.

Röntgenbefund: Rechts paravertebral vor der 2. Rippe beginnend eine gleichmäßige Verschattung, die bogenförmig den Hilus in sich einschließend in Höhe der 7. Rippe in einen intensiven, dreieckigen Schatten übergeht, der wolkig begrenzt gegen das hellere, lufthaltige Gewebe sich absetzt. Der rechte Herzzwerchfellwinkel ist intensiv verschattet. Im lk. Mittel- und Oberfeld in ziemlich reichlicher streifiger Verschattung, kleine Schattenherde, peribronchial? Der lk. Herzrand ist ebenfalls vollkommen aufgewölkt. Der lk. Hilus groß und weich.

2. Röntgenaufnahme kurz vor der Entlassung.

Das lange Dreieck ist in deutlicher Rückbildung. Vom Hilus nach abwärts zieht nur noch ein schmales Schattenband. Zwerchfelle leicht gewölbt. Herzzwerchfellwinkel noch verschattet. Die Herzkonturen sind beiderseits noch aufgewölkt.

Röntgendiagnose: Langes Dreieck, Rückbildung über ein typisches basales Dreieck bei paravertebraler Pneumonie.

45. Fall (klinisch) Kind Erne B. 3½ Jahre alt.

4 Wochen vor der Aufnahme angeblich an Lungen- und Rippenfellentzündung erkrankt, hustet immer noch. Mit dem Verdacht auf Tbc. eingeliefert.

Tuberkulinprobe: negativ.

Lungenbefund: Ueberall voller Klopfchall, über beiden Lungen Bläschenatmen. Rechts vorne, oberhalb der Mamille ab und zu Brummen und feine Rasselgeräusche.

Klinische Diagnose: Chron. Pneumonie.

Röntgenbefund: Die Hili weisen vermehrte, weiche Zeichnung auf. Auch macht sich eine weiche Strangbildung nach den Unterfeldern bemerkbar. Die Herzränder sind beiderseits, rechts mehr als links, aufgewolkt. Der Herzzwerchfellwinkel ist verichattet. Links neben dem Herzschatten eine diffuse, leichte Verichleierung der Lungenzeichnung. Der lk. Sinus phrenico-costalis ist nicht deutlich. Beiderseits aber Lungenrandlinie deutlich sichtbar.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei chron. Pneumonie.

46. Fall (poliklinisch) Ingeborg W. 3 Jahre alt.

Seit 4 Wochen Husten. Seit 8 Tagen Erbrechen, nach jeder Mahlzeit. Hustet häufiger am Tage, kein Ziehen, keine Cyanose.

Lungenbefund: Keine Schalldifferenz. Reichlich bronchitische Geräusche über beiden Lungen.

Poliklinische Diagnose: Z. B. Pleuritis.

Röntgenbefund: Ausgesprochen basales Dreieck. Der lk. Phrenico-costalwinkel ist ausgefüllt. Die Lungenrandlinie links ist deutlich. Typische Keuchhustenlunge.

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Pleuritis mediafinalis.

47. Fall (klinisch) Kind Kurt H. 6 Jahre alt.

Seit ¼ Jahr krank, wird das Kind unter Tuberkuloseverdacht, da die Anamnese sehr belastende Momente ergibt, der hiesigen Lungenberatung zugeschickt.

Moro: negativ.

Lungenbefund: Ueber der ganzen rechten Seite massive Dämpfung, kein Atemgeräusch.

Klinische Diagnose: Empyem rechts.

Operativer Eingriff: Zwischenrippenschnitt, Drainage.

Röntgenbefund: Man erkennt die Zwerchfellkonturen nach rechts deutlich. Oberhalb des rechten Zwerchfells leicht wolkige, seitliche, homogene Verschattung. Zwischen der 9. u. 10. Rippe ein gut sitzendes Drain. Schwartige Auflagerung auf der seitlichen Brustwand. Von der Wand der Empyemhöhle sieht man jetzt nichts deutliches mehr. Eine Ähnlichkeit mit Keuchhustenlunge ist unverkennbar, jedoch läßt das Röntgenbild keine andere Diagnose zu als:

Röntgendiagnose: Basales Dreieck bei Empyemresthöhle.

Uebersicht der angeführten Fälle.

Anzahl der Fälle	Klinische Diagnose	Veränderungen im Röntgenbild	Nummer der Fälle
10	Tuberkulose	Basales Dreieck	10—19
9	Bronchopneumonie	„ „	1—9
8	chron. Bronchitis	„ „	20—27
6	Grippe	„ „	28—33
4	Asthma	„ „	34—37
4	Maßern	„ „	38—41
2	Bronchiektasen	„ „	42—43
2	paravertebrale Pneumonie	„ „	44—45
1	Pleuritis mediaß.	„ „	46
1	Empyem	„ „	47

Diskussion der Fälle.

Der typische klinische Befund der Fälle 1—10 berechtigt zur einwandfreien Diagnose Bronchopneumonie. Das Röntgenbild zeigt in den Fällen 1—3 ein langes Dreieck, während sich bei den restlichen 6 Fällen das basale Dreieck vorfindet. Im Falle 8 handelt es sich um eine akute bronchitische Erkrankung mit bronchopneumonischen Herden im Röntgenbild, die wohl das basale Dreieck bedingen. Bei Fall 9 liegt eine Blähungsbronchitis mit bronchopneumonischen Herden vor.

Eine Erklärung findet das Zustandekommen des basalen Dreiecks bei der Bronchopneumonie durch die Lokalisation der bronchopneumonischen Herde. Sie haben nachgewiesenermaßen ihren Hauptsitz in Hilusnähe und entlang der entzündeten und von entzündlichem Gewebe umgebenen Bronchien. Am stärksten vertreten sind die Herde in den hinteren schlecht durchlüfteten Lungenteilen (Göbel).

Die Fälle 10—19 wurden zur Beobachtung auf Tuberkulose in die Klinik, Poliklinik und Lungenfürsorge gebracht. Sie haben alle

bei pos. Tuberkulinproben eine einwandfreie Sekundärtuberkulose, die röntgenologisch in Form des basalen Dreiecks erscheint. Bei Fall 12 erweckt die leichte Anfälligkeit für Katarrhe und das vorhandene Ekzem den Verdacht auf eine allergische Komponente.

Göttche sagt selbst in Bezug auf die Differentialdiagnose zwischen Pertussis und Tuberkulose: „Das Anfangsstadium der Pertussislunge kann von Tuberkulose überhaupt nicht unterschieden werden, auch die typ. Pertussisbilder können, wenn auch selten, Ähnlichkeit mit Tuberkulose aufweisen.“ Ich muß unbedingt auf Grund meiner Untersuchungen, 10 Tuberkuloseröntgenbilder mit basalem Dreieck wurden gefunden, feststellen, daß wohl in typ., ausgeprägten Fällen eine Differentialdiagnose durch das Röntgenbild möglich ist, daß aber andererseits eine so große Ähnlichkeit, ja Gleichheit bestehen kann, daß in vielen Fällen es unmöglich sein wird, allein aus dem Röntgenbild die richtige Diagnose zu stellen.

Bei den Bronchitisfällen 20—27 handelt es sich um Kinder, die an einer chron. Bronchitis leiden, wie aus Anamnese und Befund ersichtlich ist. In allen Röntgenbildern tritt das basale Dreieck in Erscheinung. Es sei hier erwähnt, daß es bei der chron. Bronchitis pathologisch anatomisch zu einer beträchtlichen Verdickung der Bronchialwand kommen, und daß die entzündliche Infiltration der Bronchialwand auch auf das peribronchiale Gewebe übergreifen kann. Eine Tatsache, die das Zustandekommen des basalen Dreiecks bei der chron. Bronchitis erklären könnte. Im Fall 24—25 besteht außerdem noch der berechtigte Verdacht auf Bronchiektasen. Bei Fall 24 handelt es sich um ein Kind, das 2 Jahre vor der Aufnahme einen Keuchhusten durchgemacht hat und seit dieser Zeit an immer wiederkehrenden Hustenattacken leidet. Im Röntgenbild tritt das basale Dreieck in klassischer Form auf. Es besteht nun die Frage, ist das basale Dreieck in diesem Falle eine Folgeerscheinung des 2 Jahre zurückliegenden Keuchhustens oder ist es auf evtl. vorhandene Bronchiektasen zurückzuführen? Wie wir etwas später bei 2 angeführten Bronchiektasenfällen sehen werden, haben sie genau das gleiche basale Dreieck im Röntgenbild, wie die Pertussis. Es liegt deshalb absolut im Bereiche des Möglichen, daß auch in unserem Falle die Bronchiektasen für das basale Dreieck verantwortlich zu machen sind. Andererseits dürfte es ziemlich unwahrscheinlich sein, daß nach einem 2 Jahre zurückliegenden Keuchhusten noch ein so ausgeprägtes basales Dreieck, wie im Falle 24 besteht, wenn man nicht annimmt, daß Bronchiektasen vorhanden sind.

Interessanterweise fanden sich 6 Grippefälle (28—33) mit dem basalen Dreieck im Röntgenbild. Bei 4 Fällen handelt es sich um

Frühfälle, die schon in den nachfolgenden Tagen zur Aufnahme in die Klinik kamen und sofort geröntgt wurden. Bei Fall 31 und 33 liegt die Grippeerkrankung 3 Monate zurück. Die Kinder hatten sich seit dieser Zeit nie wieder richtig erholt und husteten weiter. Auch bei diesen Spätfällen zeigt sich, wie bei den Frühfällen, ein ausgeprägtes basales Dreieck im Röntgenbild.

Anschließend, da in einem gewissen Zusammenhang mit dem vorhergehenden stehend, seien hier die Fälle 38—41 genannt, 4 einwandfrei Maernfälle mit dem basalen Dreieck im Röntgenbild. Im Falle 38 und 40 wurde die Lungenaufnahme während des Exanthems gemacht. Im Falle 39 und 41 liegt die Maernerkrankung 3 und 2 Monate zurück, aber die Kinder haben sich nie richtig erholen können, ein hartnäckiger Husten besteht fort.

Daß es zu röntgenologisch sichtbaren Veränderungen im Röntgenbild der Maernlunge kommt, war schon im Jahre 1931 bekannt als Viethen seine Arbeit über „Klinische und röntgenologische Untersuchungen maernkranker Kinder“ veröffentlichte. Auch er konnte feststellen, daß das basale Dreieck auch bei Maern im Röntgenbild auftreten kann.

Hünemann bestätigt in seiner Arbeit, daß bei Grippe und Maern Veränderungen im Röntgenbild auftreten, die ein so ähnliches Bild wie bei Pertussis bieten, daß eine sichere klinische Diagnose nur mit Hilfe des klinischen Befundes und nicht allein durch das Röntgenbild zu stellen ist.

Frick hat dann in seiner Arbeit über die Lungenveränderungen bei Keuchhusten und Maern eine Parallele zwischen Keuchhusten, Maern und Grippe gezogen, zwischen 3 Krankheitsbildern, die die gleichen Veränderungen im Röntgenbild in Gestalt des basalen Dreiecks aufweisen. Auch besteht bei allen 3 Erkrankungen eine Ähnlichkeit in Bezug auf den anatomisch pathologischen Befund. Seine Erklärung für die Übereinstimmung der Röntgenveränderungen bei diesen drei verschiedenen Krankheitsbildern ist unbedingt einleuchtend. Alle drei Krankheiten gehören unter den Begriff „Schrittmacherkrankheit“, d. h. der Erreger dieser drei Krankheiten bahnt den Weg für eine sekundäre Mischinfektion. Bei Maern und Grippe geschieht diese Anbahnung der sekundären Mischinfektion wegen des rascheren Ablaufes der Erkrankung früher als bei Pertussis, und deshalb haben wir bei Grippe und Maern ein viel früheres Auftreten des basalen Dreiecks im Röntgenbild als bei Keuchhusten. Wie schon oben erwähnt, besteht bei den vorstehenden drei Krankheitsbildern auch in dem path. ana-

tomischen Bild eine große Ähnlichkeit. Alle drei Infektionskrankheiten haben die Eigentümlichkeit, daß sich oft die Entzündungsprozesse, sei es in Form einer eitrigen Bronchitis oder einer Bronchopneumonie, im Interstitium abspielen (Henke und Lubarsch). Bei allen drei Erkrankungen haben wir eine langsame Lösung dieser interstitiellen Lungenveränderungen, die Monate in Anspruch nehmen kann, wie wir das bei den Masernfällen 39 und 41 und den Grippefällen 31 und 33 sehen. Hier ist natürlich immer auch an die Möglichkeit der Entstehung von Bronchiektasen zu denken.

Bei den Asthmafällen 34—37 auf allergischer und tuberkulöser Grundlage finden sich ebenfalls Lungenveränderungen im Röntgenbild im Sinne des basalen Dreiecks. Pathologisch anatomisch ist festgestellt worden, daß die normale Asthmabronchitis, die ohne Mitbeteiligung des Interstitiums einhergeht, bei längerem Bestehen des Asthmas in die chronische Bronchitis übergeht, d. h. daß es zu einer beträchtlichen Verdickung der Bronchialwand kommen, und daß die entzündliche Infiltration auch auf das peribronchiale Gewebe übergreifen kann (Henke und Lubarsch). Es kann also zum Auftreten des basalen Dreiecks im Röntgenbild bei Asthma kommen, vorausgesetzt, daß die Erkrankung längere Zeit besteht und die Entzündung des Bronchialbaums auf das peribronchiale Gewebe übergegangen ist.

Im Fall 42 und 43 besteht besteht anfangs der Verdacht auf eine Tuberkulose, die durch den klinischen Befund und die negativen Tuberkulinproben ausgeschlossen wird. Anamnese und Befund lassen in beiden Fällen an Bronchiektasen denken. Bei beiden Fällen, genau so wie bei Fall 24 und 25, die an dieser Stelle noch einmal als Bronchiektasenfälle der Erwähnung bedürfen, erscheint im Röntgenbild ein ausgebildetes basales Dreieck.

Schon in der im Jahre 1928 erschienenen Arbeit von Duken und von den Steinen über das „Krankheitsbild der Bronchiektasen im Kindesalter“ wird festgestellt, daß die Differentialdiagnose zwischen Pertussislunge und Bronchiektasen im Röntgenbild große Schwierigkeiten bereiten kann. Duken sagt u. a.: „Kaum weniger schwierig ist die Differentialdiagnose zwischen echten Bronchiektasen und der Pertussislunge“. . . . Da nun auch noch die Pertussis zumal in Verbindung mit Bronchopneumonie zu den häufigen Ursprungs-krankheiten der Bronchiektasen gehört, scheint uns die entscheidende Differentialdiagnose, ob im jeweilig vorliegenden Fall nur eine Pertussislunge oder doch Bronchiektasen bestehen, klinisch oft kaum lösbar zu sein außer durch Kontrastfüllung“.

Im Falle 44 haben wir das Bild einer paravertebralen Pneumonie vor uns, die im Röntgenbild eine Rückbildung vom langen Dreieck über das basale Dreieck zeigt. Auch Göttche erwähnt, daß unter den paravertebralen Säuglingspneumonien viele zu finden sind, die ein basales Dreieck im Röntgenbild zeigen und eine Differentialdiagnose der Pertussis gegenüber durch das Röntgenbild schwierig erscheinen lassen.

Fall 45 wird unter dem Verdacht auf Tbc. eingewiesen, die jedoch klinisch ausgeschlossen wird. Das Röntgenbild zeigt ein basales Dreieck bei chronischer Pneumonie.

Bei Fall 46 zeigt sich auf der Röntgenaufnahme eine Ummauerung des Herzschattens mit besonderer Beteiligung der Pleura mediastinalis in Form eines basalen Dreiecks. Anamnese und Befund schließen einen Keuchhusten aus. Nur der Vollständigkeit wegen wurde Fall 47 hinzugefügt, der bei der klinischen Diagnose metapneumonisches Empyem ein basales Dreieck im Röntgenbild zeigt.

Um nun auch umgekehrt von der klinischen Diagnose Pertussis ausgehend den Grad der klassischen Veränderungen in Form des basalen Dreiecks im Röntgenbild nachprüfen zu können, wurden sämtliche Krankengeschichten mit der klinischen Diagnose Pertussis herausgesehen und die dazugehörigen Röntgenaufnahmen auf das Vorhandensein des basalen Dreiecks überprüft. Es fanden sich insgesamt 61 Pertussisfälle. 42 Fälle wurden früher schon erwähnt und haben im Röntgenbild das basale Dreieck.

Die übrigbleibenden 19 Fälle haben kein basales Dreieck im Röntgenbild. Eine genauere Uebersicht gestattet nachstehende Zusammenstellung.

Zahl der Fälle	Klin. Stadium	Röntgenbefund
42	Stad. konvulsiv.	basales Dreieck.
15	Stad. konvulsiv.	kein basales Dreieck.
4	Uebergangsstadium	kein basales Dreieck.

Nach Göttche soll das basale Dreieck bei den schweren Pertussisfällen fast immer und bei den leichten zu 40% vorhanden sein. Es handelt sich bei unseren 15 Fällen um schwere Pertussisfälle, die sich im Stad. konvulsivum befinden, ohne ein basales Dreieck im Röntgenbild aufzuweisen. Die 4 übrigbleibenden Fälle stehen am Uebergang vom Stadium katarrhale zum Stadium konvulsivum und haben vielleicht aus diesem Grunde noch kein basales Dreieck im Röntgenbild. Vermehrte Hiluszeichnung ist vorhanden.

Zusammenfassung.

Aus der Zusammenfassung der einzelnen vorstehenden Feststellungen ergibt sich, daß wohl die von Göttche beschriebenen charakteristischen Veränderungen in Form des basalen Dreiecks auftreten, aber unter meinen 89 Fällen nur bei 42 Pertussisfällen, während sich die restlichen 47 Fälle auf 10 verschiedene Krankheitsbilder verteilen. Die größte Anzahl der Fälle mit dem basalen Dreieck im Röntgenbild fällt unter die Krankheitsbilder der Tuberkulose, Bronchopneumonie und chron. Bronchitis. Alles Fälle bei denen das Interstitium mitbeteiligt ist. Masern und Grippe als „Schrittmacherkrankheiten“ für eine sekundäre Mischinfektion, und damit ebenfalls Beteiligung des Interstitiums, zeigen bei je 4 Fällen das basale Dreieck im Röntgenbild. An dieser Stelle sei nochmals hervorgehoben, daß Bronchiektasen und Pertussis im Röntgenbild eine verblüffende Ähnlichkeit aufweisen können. Die Differentialdiagnose kann erst durch Kontrastfüllung gestellt werden. Andererseits ließen sich 19 Pertussisfälle feststellen, bei denen kein basales Dreieck im Röntgenbild vorhanden ist. Das Vorkommen des basalen Dreiecks im Röntgenbild bei Pertussis wird durch 42 Pertussisfälle bestätigt. Zusammenfassend läßt sich wohl sagen, daß die Feststellungen Göttches richtig sind, daß wohl das basale Dreieck bei Pertussis im Röntgenbild auftritt, daß aber wegen der Mannigfaltigkeit des Vorkommens des basalen Dreiecks bei verschiedenen anderen Krankheitsbildern seine Bezeichnung als Typ der Keuchhustenlunge nicht berechtigt scheint.

Das basale Dreieck kann bei allen den Erkrankungen im Röntgenbild auftreten, die mit einer Entzündung der vom Hilus nach beiden Unterlappen verlaufenden Bronchien und ihrer näheren Umgebung, des Interstitiums einhergehen.

Literaturverzeichnis.

- Duken und Runhilt von der Steinen:** Das Krankheitsbild der Bronchiektasen im Kindesalter. Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde, Berlin 1928.
- Duken:** Die eitrige Keuchhustenbronchitis und ihre Behandlung. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Band 50, 1930.
- Feyrter:** Frankfurter Zeitschrift für Pathologie, Band 35, 1927.
- Frick:** Die Lungenveränderungen bei Keuchhusten und Mafern. Kinderärztliche Praxis, 5. Jg., Heft 9, 1934.
- Göbel:** Erkrankungen vom Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Lungen, Pleura und Mediastinum. Lehrbuch der Kinderheilkunde, Verlag Springer 1933 (herausgegeben v. Prof. Degkwitz).
- Göttche:** Mon.-Schrift f. K.H.K. XLIV 1929. Die Pertussislunge und ihr Röntgenbild.
- Göttche:** Die Pertussislunge. Handbuch der Röntgendiagnostik u. Therapie im Kindesalter (Prof. Engel und Dr. Schall).
- Henkel u. Lubarsch:** Handbuch der spez. Pathologie u. Histologie 3. Band. I. Teil. Verlag Springer 1928.
- Hünemann:** Röntgenologie der Keuchhustenlunge und ihre Bedeutung für die Klinik. Mon.-Schrift für K.H.K. Band 57 Heft I 1933.
- Pospischill:** Klinik u. Epidemiologie der Pertussis. Verl. Karger 1921.
- Viethen:** Klinische und röntgenologische Lungenuntersuchung mafernkranker Kinder. Klinische Wochenschrift, 10. Jg., 2. Halbjahr 1931.

Lebenslauf.

Ich, Helmut Zulauf, bin geboren 29. 11. 1909 in Darmstadt, als Sohn des derzeitigen Rechnungsdirektors Friedrich Zulauf und seiner Ehefrau Auguste geb. Wolff. Von 1916 bis 1928 besuchte ich das Realgymnasium zu Darmstadt, wo ich am 15. 2. 1928 das Reifezeugnis erhielt. Anschließend begann ich das Medizinstudium mit dem 1. Semester an der Universität Frankfurt a. M. Vom 2.—5. Semester studierte ich an der Universität in Gießen. Hier bestand ich im Sommer 1931 die ärztliche Vorprüfung. Das 1. klinische Semester verbrachte ich in Gießen, das 2. in Wien und das 3.—6. Semester wieder in Gießen, wo ich am 16. 12. 1933 das ärztliche Staatsexamen bestand.

